

IMPORTANCIA DE LA VISTA LATERAL COMO COMPLEMENTO DE LA VISTA POSTEROANTERIOR DEL TORAX

PRESENTACION DE UN CASO

AUTORES: DAMARIS CRUZ AVILA

LIC: IMAGENOLÓGIA

HOSPITAL CLINICO QUIRURGUICO "HERMANOS AMEIJERAS"

Introducción:

El adenocarcinoma es el tipo de cáncer mas frecuente del pulmón en las mujeres y en los pacientes no fumadores, crecen con mayor lentitud , pero tienden a metatizar precozmente. Solo alcanza la curación una minoría de los pacientes. Dentro de la sintomatología los pacientes pierden peso, apetito y pueden cursar con disnea.

Caso Clínico:

Paciente de 58 años de edad, masculino, fumador, que hacia 7 meses presentaba anorexia y astenia.


Examen Físico:

Positivo, mucosa hipo coloreada.

Estudios Realizados

Rayos x de tórax en vista PA, visualizándose horizontalización de los arcos costales posteriores con aumento de los espacios entre los mismos, aumento de la trama bronco vascular y horizontalización de ambos hemidiafragmas, presencia de bullas en ambos lóbulos superiores. Signos radiológico que se mantienen hasta el mes del diagnóstico por lo que se le indica rayos X en la vista lateral de tórax, apreciándose una masa tumoral de contornos espiculados de 3x 4 cm en el segmento del lóbulo superior izquierdo.

VISTA LATERAL
DE TORAX



VISTA POSTEROANTERIOR DE TORAX



FIN